


При підозрі на спадковий
ангіоневротичний набряк



**Спадковий ангіоневротичний набряк:
простими словами про рідкісне захворювання**

дізнайтеся більше





При підозрі на спадковий ангіоневротичний набряк



Спадковий ангіоневротичний набряк: простими словами про рідкісне захворювання

Спадковий ангіоневротичний набряк (САН) – це рідкісне генетичне захворювання, яке проявляється повторювальними підшкірними набряками кінцівок, обличчя та статевих органів, а також може проявлятися у вигляді болю, спричиненого набряком черевної порожнини.

«Спадковий» означає те, що люди народжуються із цим типом ангіоневротичного набряку, успадковують його від одного з батьків та можуть передавати своїм дітям. І хоча людина із САН може хворіти протягом усього життя, сучасне лікування допомагає полегшити перебіг хвороби.

Наразі методи лікування та діагностики САН досягли значного успіху, але дослідники продовжують шукати нові рішення.

Поширеність САН оцінюється приблизно в 1 випадок на кожні 50 000 осіб у загальній популяції. Спадковий ангіоневротичний набряк виникає внаслідок генних мутацій, які кодують важливий фермент, відомий як інгібітор C1.

Симптоми найчастіше спочатку проявляються в дитинстві та посилюються у підлітковому віці. Багато людей не знають, що їхні набряки спричиняє саме САН, аж поки вони не стануть дорослими. Напади САН зазвичай з'являються та самотійно проходять, а також набряки можуть переміщуватися в різні місця під час одного нападу. Набряк також може виникати у горлі або гортані, внаслідок чого можуть

Ця інформація доступна широкому загалу лише в ознайомлювальних цілях; вона не повинна використовуватися для діагностики або лікування захворювання. Вона не призначена для заміни консультації лікаря. Будь-ласка, зверніться до свого лікаря за подальшою консультацією

повністю перекриватися дихальні шляхи, що є небезпечним для життя. Тож якщо людина знає, що у неї САН і відчуває подібні зміни, потрібно негайно звернутися до медичного закладу.

Частота нападів може бути різною. У хворої людини напади можуть виникати кожні 1-2 тижні або 1-2 рази на рік.

Основним симптомом є набряк. Люди із САН не відчувають свербіння і не мають кропив'янки, які часто виникають у людей під час алергічних реакцій. При САН набряк може виникати на найрізноманітніших частинах тіла:

- у ділянці горла або ротової порожнини;
- на руках;
- на ногах;
- на обличчі;
- на статевих органах;
- у черевній порожнині.

Набряк у горлі – найнебезпечніший симптом.

Набряклість ніг і рук може бути болючою та ускладнювати повсякденне життя.

Здуття живота у пацієнтів із САН може зумовити такі симптоми:

- сильний біль;
- нудоту;
- блювоту;
- діарею.

Літературне джерело: Caballero T, et al. Allergy Asthma Proc. 2014;35(1):47-53.2. Bork K, et al. Am J Med. 2006;119(3):267-74. 2. Стандарти медичної допомоги «Спадковий ангіоневротичний набряк» 2023;ГС 2023-159

Пацієнтів із САН та їхніх родичів об'єднує ГО «Українська асоціація пацієнтів на спадковий ангіоневротичний набряк» (<https://ua.haei.org>).

© ТОВ «Такеда Україна» 2023. Всі права захищені.

«ТАКЕДА» та  є зареєстрованими торговельними марками компанії «Takeda Pharmaceutical Company Limited»

ТОВ «Такеда Україна», вул. Солом'янська, 11, БЦ Eleven, 11-й поверх, 03110, Київ, Україна
Тел.: +380 44 390 09 09. Факс: +380 44 390 29 29. E-mail: ua-info@takeda.com

