

Щойно встановлено спадковий ангіоневротичний набряк



**Напад спадкового
ангіоневротичного набряку:
що важливо знати**

дізнайтеся більше



На правах реклами

VV-MEDMAT-95525

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я



Щойно встановлено спадковий ангіоневротичний набряк



Напад спадкового ангіоневротичного набряку: що важливо знати

Під час нападу спадкового ангіоневротичного набряку (САН) успадкована генетична мутація призводить до низки подій, які спричиняють набряк. **Такий набряк суттєво відрізняється від проявів алергії.**

На жаль, неможливо визначити, наскільки важким буде наступний напад.

Потенційні тригери нападу спадкового ангіоневротичного набряку.

Напади САН часто відбуваються спонтанно, без зв'язку з відомим провокуючим чинником (тригером).

Тригерами можуть бути:

- незначна травма (через поранення або удар по тілу);
- стрес;
- стоматологічні процедури;
- інфекції;
- хірургічні втручання;
- гормональні зміни.

Водночас варто ще раз наголосити на тому, що багато нападів відбуваються без очевидного зв'язку з тригером, через що дуже важко передбачити загострення САН, навіть у разі уникання впливу провокуючих чинників.

Антигістамінні препарати та інші засоби лікування алергічного ангіоневротичного набряку малоефективні або неефективні.

Кожен, хто страждає на САН, має різний набір факторів, які можуть спричиняти напади. Виявлення, фіксування та уникнення їх може значно покращити лікування хвороби.

Ведення щоденника з описом нападів і можливих тригерів може допомогти визначити їхні потенційні причини. На записи у такому щоденнику також можна посилається, щоб згадати деталі під час обговорення лікування з лікарем. Слід включати до опису тяжкість нападу, можливий тригер, метод лікування та відповідь на лікування.

VV-MEDMAT-95525

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я



Щойно встановлено спадковий ангіоневротичний набряк



Для пацієнтів з САН може бути доцільним:

- мати план дій на випадок раптового нападу САН;
- хворому та його близьким людям слід завжди мати поруч ліки від САН та вміти їх використовувати;
- носити ідентифікаційну картку хворого на САН з інструкціями щодо дій у разі нападу хвороби;
- слід надати письмові інструкції вихователям, які здійснюють догляд за дитиною у дитячих садках і школах, щодо, власне, захворювання, уникнення тригерів нападу САН та алгоритму дій у разі нападу.

Ось посилання на декілька варіантів щоденників:

- електронний_1
- електронний_2
- паперовий

Ця інформація доступна широкому загалу лише в ознайомлювальних цілях; вона не повинна використовуватися для діагностики або лікування захворювання. Вона не призначена для заміни консультації лікаря. Будь-ласка, зверніться до свого лікаря за подальшою консультацією

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

Літературне джерело: 1. Busse PJ, et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021;9(1):132-150.e3. 2. Стандарти медичної допомоги «Спадковий ангіоневротичний набряк» 2023;ГС 2023-159

Пацієнтів із САН та їхніх родичів об'єднує ГО «Українська асоціація пацієнтів на спадковий ангіоневротичний набряк» (<https://ua.haei.org>).

Містить рекламу медикаментозного методу лікування, профілактики. Не є рекламою медичних послуг

© ТОВ «Такеда Україна» 2023. Всі права захищені.

«ТАКЕДА» та  є зареєстрованими торговельними марками компанії «Takeda Pharmaceutical Company Limited»

ТОВ «Такеда Україна», вул. Солом'янська, 11, БЦ Eleven, 11-й поверх, 03110, Київ, Україна
Тел.: +380 44 390 09 09. Факс: +380 44 390 29 29. E-mail: ua-info@takeda.com

