


Я маю
спадковий ангіоневротичний набряк



**Іду до стоматолога.
Як краще підготуватися?**

дізнайтеся більше




VV-MEDMAT-95536

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я



Я маю спадковий ангіоневротичний набряк



Іду до стоматолога. Як краще підготуватися?

Якщо хворому на САН потрібна допомога стоматолога, перш за все, перед процедурою доцільним може бути обговорити з лікарем, який займається лікуванням САН, питання короткострокової профілактики. По-друге, лікар-стоматолог повинен бути заздалегідь поінформований про наявність у пацієнта САН.

Короткострокову профілактику препаратом на основі плазми крові можна проводити перед самою стоматологічною процедурою, але не раніше ніж за 24 години до неї.³

Якщо такий пацієнт приймає препарати для довгострокової профілактики САН, лікар може порекомендувати посилити терапію САН перед візитом до стоматолога і протягом декількох днів після лікування зубів.

Процедури з найвищим ризиком загострення САН – це медичні маніпуляції в області голови та шиї, хірургічні операції в ротовій порожнині та

значні стоматологічні втручання (наприклад, пов'язані з розрізанням тканин або ін'єкціями анестетиків). Ці процедури можуть спричинити напад у більшості пацієнтів із САН.

Незначні стоматологічні процедури мають менший ризик загострень САН. Однак у різних пацієнтів може значно відрізнятись набряк, спричинений стоматологічною процедурою.

Пацієнтам, в яких у подібних ситуаціях у минулому виникали набряки, може бути показана профілактика в майбутньому, навіть при незначних втручаннях. Хворі, які в минулому переносили ці процедури без загострень, можуть продовжувати толерувати такі втручання. Якщо переносимість пацієнтом даної процедури невідома, короткочасна профілактика може бути доцільною

Посилання на пам'ятку пацієнта щодо лікування та профілактики САН

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

1. Busse PJ, et al. J Allergy Clin Immunol Pract.2021;9(1):132-150.e3. 2. Стандарти медичної допомоги «Спадковий ангіоневротичний набряк» 2023;ГС 2023-159. 3.Jindal, Ankur Kumar et al. "Management of hereditary angioedema in resource-constrained settings: A consensus statement from Indian subcontinent." Asia Pacific allergy vol. 13,2 (2023)

Пацієнтів із САН та їхніх родичів об'єднує ГО «Українська асоціація пацієнтів на спадковий ангіоневротичний набряк» (<https://ua.haei.org>).

Містить рекламу медикаментозного методу лікування та профілактики спадкового ангіоневротичного набряку препаратом на основі плазми крові. Ця інформація доступна широкому загалу лише в ознайомлювальних цілях; вона не повинна використовуватися для діагностики або лікування захворювання. Вона не призначена для заміни консультації лікаря. Будь-ласка, зверніться до свого лікаря за подальшою консультацією

© ТОВ «Такеда Україна» 2023. Всі права захищені.

«ТАКЕДА» та  є зареєстрованими торговельними марками компанії «Takeda Pharmaceutical Company Limited»

ТОВ «Такеда Україна», вул. Солом'янська, 11, БЦ Eleven, 11-й поверх, 03110, Київ, Україна
Тел.: +380 44 390 09 09. Факс: +380 44 390 29 29. E-mail: ua-info@takeda.com

